



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4901 от « 19 » июня 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано
ООО «АГРУСХИМ», ОГРН 1057747562509

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Клотиамет Дуо, КС (140 г/л клотианидина + 100 г/л лямбда-
цигалотрина) (наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 002-03-4901-0

на срок по « 18 » июня 2028 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№005470

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения препарата	Сроки ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1 - 0,2	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, трипсы, пьявицы, злаковые мухи, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	50(2)
0,22 - 0,3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов весной. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	50(1)
0,1 - 0,2	Ячмень яровой и озимый	Пьявицы, злаковые мухи, трипсы, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	50(2)
0,1 - 0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	38(2)
		Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
0,15 - 0,25	Соя	Клубеньковый долгоносик	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	20(2)
		Многоядные совки, бобовая огневка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
0,15 - 0,25	Свёкла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	50(2)
		Свекловичная листовая тля, свекловичный долгоносик-стеблел, свекловичные минирующие мухи, свекловичная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,1 - 0,25	Зернобобовые, за исключением сои (семенные посевы)	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	- (2)

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов и в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

