



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1310 от « 21 » декабря 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Краснодарский биоцентр», ОГРН 1082323000430; ООО «ФОРВАРД»,
ОГРН 1105476055277; ООО «Франдеса» (Республика Беларусь)

(наименование Регистрации, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Сотейра, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 248 (042, 297)-03-1310-1

на срок по « 20 » декабря 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



№ 001490

**Для сельскохозяйственного производства и применения на землях
несельскохозяйственного назначения:**

Норма применения препарата, л/га	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1-1,2	Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолино- нам)	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2- 4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не менее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох-через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс-через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости-200- 300 л/га	60(1)
2	Земли несельского- хозяйственного назначения	Борщевик Сосновского	Опрыскивание участков, засоренных борщевиком Сосновского при его высоте 10- 15 см. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	60(1)
		Амброзия полыннолис- т-ная	Опрыскивание участков, засоренных амброзией полыннолистной в фазу всходов и до высоты 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	

Срок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещено применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов; авиационным методом.

