




Кломатек, КЭ





Схема защиты **СОЯ**





Кломатек, КЭ

состав препарата

Кломазон 480 г/л

Гербицид избирательного действия для довсходовой и послевсходовой обработки против многих злаковых и двудольных сорняков





Кломатек, КЭ

основные преимущества

- 1 Обладает высокой степенью избирательности к бобовым культурам.
- 2 Не требует механической заделки в почву.
- 3 Хороший партнер для баковых смесей.
- 4 Эффективно подавляет подмаренник цепкий.
- 5 Распадается на нетоксичные соединения под действием почвенной биоты.





Кломатек, КЭ

Контролирует более 50 видов однолетних и некоторых многолетних двудольных и злаковых сорняков, в том числе трудноискоренимых.

Однолетние двудольные:

- Марь белая
- горец (виды)
- амброзия полыннолистная
- горчица полевая
- паслен черный
- портулак огородный
- падалицы подсолнечника
- канатник Теофраста
- пупавка полевая
- пастушья сумка обыкновенная
- пикульник обыкновенный
- ярутка полевая
- яснотка стеблеобъемлющая

Многолетние двудольные:

- хвощ полевой
- пустырник
- бодяк огородный

Злаковые:

- просо куриное
- мятлик обыкновенный
- ежовник обыкновенный
- росичка



Кломатек, КЭ

спектр действия: однолетние двудольные



Марь Белая



Канатник терфраста



Яснотка
Пурпурная



Амброзия
полынолистная



Кломатек, КЭ

спектр действия: однолетние двудольные



Пастушья сумка



Портулак



Горчица полевая



Паслен черный



Кломатек, КЭ

спектр действия: многолетние двудольные



Хвощ полевой



Пустырник




Бодяк огородный



Кломатек, КЭ

механизм действия:

Препарат поступает в растение через корневую систему, побеги и листья. Подавляет биосинтез хлорофилла и каротиноидов, тем самым останавливая процесс фотосинтеза. В результате сорняки останавливаются в росте, приобретают хлоротичную окраску и погибают.





Кломатек, КЭ

особенности применения



Соя (опрыскивание почвы до всходов или в фазу 3-х настоящих листьев)

Срок ожидания
60 суток

Рекомендуемое время обработки: При температуре от 5°C до 25°C тепла. Утренние и вечерние часы



Кломатек, КЭ

особенности применения



Фаза развития однолетних злаковых сорняков:
2 - 4 листа (молодые, активно растущие сорняки)



Фаза развития однолетних двудольных сорняков:
2-4 листа (молодые, активно растущие сорняки)

При выборе срока внесения предпочтительнее ориентироваться на стадию развития сорняков, а не культуры!



Кломатек, КЭ

баковые смеси

Применение до всходов культуры: Соя

Кломатек, КЭ 0,7 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – базовая комбинация для борьбы с общей засоренностью полей;

Кломатек 0,3 л/га + Геразол, ВРК 0,5 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – до всходов, для наилучшего сдерживания сорной растительности

Применение по всходам: соя

Кломатек, КЭ 0,3 л/га + Бентилон, ВР 2,0 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – для лучшего контроля мари белой, амброзии, щирицы и других трудноискоренимых сорняков, в том числе и падалица подсолнечника всех технологий.

Кломатек, КЭ 0,1 л/га + Геразол, ВРК 0,4 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – против однолетних злаковых и некоторые многолетних двудольных сорняков.

Кломатек, КЭ 0,2 л/га + Юзмар, ВР 0,5 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорняками.



Кломатек, КЭ

приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор готовится непосредственно перед применением, для этого:

- Предварительно препарат перемешивают в заводской таре.
- Бак опрыскивателя на $\frac{1}{2}$ заполняют чистой водой, включают механизм перемешивания.
- Добавляют рассчитанное и отмеренное количество препарата.
- Продолжают заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием до полного объема.
- Перемешивание продолжают во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси.

Рабочий раствор использовать в день обработки.



Кломатек, КЭ

регламент применения

культура	Вредный объект	Способ, время, особенность применения	норма расхода препарата, г /га
Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-го настоящего листа. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	0,7-1,0



Кломатек, КЭ


отзывы/примеры работы



В хозяйстве СПК Красная звезда проводился опыт на посевах культуры соя следующей баковой смесью: Кломатек 0,3л/га + Бентилон 2,0л/га + Сильвер Голд 0,07л/га. Данная баковая смесь сработала на 100%. Освободила посевы сои от сорной растительности. На следующий год планирует отработать аналогичной схемой, также по посевам сои. Также после обработки данной баковой смесью, фитотоксичности на культуре не наблюдалось.



Схема защиты **СОЯ**





agromir.online

Задать вопрос

