



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3458 от « 28 » декабря 2021 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ИНТЕР ГРУПП», ОГРН 1084312000420

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Глифор, ВР (360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль))

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 082-03-3458-0

на срок по « 27 » декабря 2023 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)

№ 003884



Для сельскохозяйственного производства и для применения на землях несельскохозяйственного назначения:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2-5	Поля под посевы (посадки) свеклы сахарной, кукурузы	Однолетние и многолетние сорные растения, в т.ч. пырей	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)
3	Поля под посевы (посадки) сои, подсолнечника, капусты	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание сорных растений за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
	Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
4-6		Многолетние злаковые и двудольные сорные растения		
6-8		Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свиной) сорные растения		
2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Глифор, ВР
(360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль) от 28 декабря 2021 г. № 3458

1	2	3	4	5
4-6	Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)
6-8		Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) сорные растения		
4-8	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
0,5-0,6	Люцерна	Повилика тонкостебельная	Наземное опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
3-4	Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки	
4-6	электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории)	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растения		

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Глифор, ВР
(360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль) от 28 декабря 2021 г. № 3458

В случае производственной необходимости проведения работ на обработанных участках срок безопасного выхода людей на эти площади — не ранее 7 дней после обработки.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах, в черте населенных мест, в сельском хозяйстве в качестве десиканта культур и в качестве гербицида в виноградниках, на посадках плодовых и цитрусовых, на посадках картофеля до всходов, на полосах отчуждения вдоль оросительных, дренажно-сборных и осушительных каналов, на открытых оросительных и коллекторно-дренажных осушительных сетях.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



