

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНАЯ ПРОГРАММА ОТ «БАЙЕР». СВИНОВОДСТВО



БАЙОБЕЗОПАСНОСТЬ



Квик Байт®
ВГ 10%



**Распыляемая приманка
для эффективного
контроля численности мух**

Опрыскивание (зигзагом): давление 1 бар: 250 г препарата (375 мл=5 мерных стаканчиков) на 2 л воды – достаточно обработать 30% поверхности стен помещения с площадью пола 100 м².

Мазки: 250 г препарата на 200 мл воды – необходимо нанести на стены помещения с площадью пола 100 м². Обработке подлежат вертикальные поверхности.

В целях предотвращения контакта животных с инсектицидом, поверхности стен следует опрыскивать на высоте от 0,5 м до 1,5 м.



Сольфак®
МЭ 5%



**Инсектоакарицид
пролонгированного
действия**

Опрыскивание (зигзагом): давление 2–3 бар: 50–100 мл препарата на 10 л воды, нанести на 100–500 м² поверхности.



Байцидал®
ВП 25%



**Ларвицид – эффективно
борется с личинками
насекомых (мухи, жуки и др.)**

Пол – решетка, подстилка (любая), места расплода насекомых внутри и вне помещения: 20 г препарата на 10 л воды нанести на 10 м² поверхности. Обработке подлежат горизонтальные поверхности.
Навозные ямы: 8 г препарата на 1 л воды, обработать 1000 л навозной жижи, не перемешивать.

Программа обработки помещений для содержания поросят



Программа обработки помещений для содержания свиноматок



Условные обозначения: ■ Квик Байт ВГ 10% ■ Сольфак МЭ 5% ■ Байцидал ВП 25% Период откорма Санитарный разрыв

* кратность может изменяться в зависимости от энтомологической ситуации в хозяйстве

ЗАО «БАЙЕР». 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: + 7 (495) 234 2055, + 7 (495) 234 2065, ru-animal-health@bayer.com.
www.bayeranimalhealth.ru

