



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4548 от « 2 » мая 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л флуазифоп-П-бутила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-03-4548-1

на срок по « 1 » мая 2034 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№005076

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, (л/га)	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения пестицида	Сроки ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,75-1,0	Люпин желтый кормовой (семенные посевы)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
1,5-2,0		<i>Пырей ползучий</i>	Опрыскивание посевов при высоте <i>пырея ползучего</i> 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,75-1,0	Свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белокочанная (кроме ранних сортов), лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов)	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
1,5-2,0		<i>Пырей ползучий</i>	Опрыскивание посевов при высоте <i>пырея ползучего</i> 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
1,5	Лен-долгунец	<i>Пырей ползучий</i>	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» льна и при высоте <i>пырея ползучего</i> 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
1,5-2,0	Клевер ползучий и луговой, эспарцет (семенные посевы)	Однолетние и многолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов через 2-3 недели после уборки покровной культуры или после ранневесеннего подкашивания травостоя культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л флуазифоп-П-бутила) от 2 мая 2024 г. № 4548

1	2	3	4	5
0,75-1,0	Горох (кроме овощного), подсолнечник, соя	Однолетние злаковые сорные растения	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
1,5-2,0		<i>Пырей ползучий</i>	Опрыскивание посевов при высоте <i>пырея ползучего</i> 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Запрещается применение препарата: авиационным методом, личных подсобных хозяйств, водоохраной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



