



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 495 от « 29 » декабря 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Альто Супер, КЭ (250 г/л пропиконазола+80 г/л ципроконазола)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-02-495-1

на срок по « 28 » декабря 2024 г. и допускается к обороту на
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев



№ 000550



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4-0,5	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и на колосе, пиренофороз, церкоспореллез, фузариоз (частичное действие)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)
0,4-0,5 (А)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	
0,4-0,5	Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)
	Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ржавчина стеблевая, ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	
0,4-0,5 (А)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 50 л/га	
0,4-0,5	Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30(1-2)
0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее - с интервалом 15-20 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	

Сроки выхода для механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, в водоохранной зоне водных объектов. Разрешается применение препарата авиационным методом.

