



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2980 от « 18 » января 2021 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Ридомил Голд Р, ВДГ (142 г/кг меди оксихлорида +
20 г/кг мефеноксама) (наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-02-2980-1

на срок по « 17 » января 2031 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№003183

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
4-5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – смыкание рядков, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	14(3)
	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	5(2)
	Томат защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800 л/га	
	Огурец открытого грунта		Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	
	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	15(3)
	Лук	Пероноспороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактически, второе через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га	
	Виноград	Милдью, антракноз	Опрыскивание растений в период вегетации: первое – профилактически, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади по уходу за растениями для проведения механизированных и ручных работ – 3 дня.

Срок безопасного выхода людей в теплицу на обработанные пестицидом площади по уходу за растениями для проведения ручных работ – 1 день.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

