



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4430 от « 27 » февраля 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Квадрис, СК (250 г/л азоксистробина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-02-4430-0

на срок по « 26 » февраля 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№ 004956

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4-0,6	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га	3(2)
0,8-1,0	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации после цветения 1-2 кистей, последующее с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	
0,4	Огурец открытого грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800 л/га	
0,4	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1500 л/га	
0,8-1,0	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое, последующее с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	15(3)
3,0	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша	Опрыскивание почвы при посадке клубней. Расход рабочей жидкости – 80-200 л/га	60(1)
0,6-0,8	Виноград	Милдью, оидиум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	25(2)

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в личных подсобных хозяйствах, в водоохраной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади в сельском хозяйстве для проведения механизированных работ - 3 дня, ручных работ - 7 дней.

Срок безопасного выхода людей в теплицы для проведения ручных работ – 2 дня.

