



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1396 от « 6 » марта 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Груп», ОГРН 1027708006996

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фумифаст, ТАБ, Г (560 г/кг алюминия фосфида)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 178-01-1396-1

на срок по « 5 » марта 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев


(подпись)



№ 001581



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработки)
1	2	3	4	5
5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые-вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. ПКЭ - 25 г·ч/м ³ . Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	-(1)
5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 8-10 суток. Производство концентрации на время экспозиции ПКЭ - 450 г·ч/м ³ . Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. В элеваторах - введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах - введение таблеток в насыпь зерна с помощью зондов. Затаренное в мешки - раскладка на подложки. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м ³ . Дегазация - не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК	
		Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. В элеваторах - введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах - введение таблеток в насыпь зерна с помощью зондов. Затаренное в мешки - раскладка на подложках. Экспозиция - 8-10 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м ³ . Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе не выше ПДК	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Фумифаст, ТАБ, Г (560 г/кг алюминия фосфида) от 6 марта 2017 г. № 1396

1	2	3	4	5
9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах-зерновозах в пути следования	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 3-5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м ³ . Дегазация зерна в вагоне перед загрузкой не менее 1 часа. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)
		Хлебные клещи	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция – 8-10 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м ³ . Дегазация зерна в вагоне перед загрузкой не менее 1 часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе не выше ПДК	
2,4 г/м ³	Зерно злаковых культур, тапиока и шроты в трюмах судов балкерного типа и танкерах	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция при использовании технологии “фитоэксплофумигация” - 16 суток; метода рециркуляции - не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м ³ и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м ³ . Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П. А. Чекмарев



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Фумифаст, ТАБ, Г (560 г/кг алюминия фосфида) от 6 марта 2017 г. № 1396

1	2	3	4	5
6 г/м ³	Мука и крупа в складах или под пленкой	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ для муки 7 г·ч/м ³ , для крупы только с явной формой зараженности - 7 г·ч/м ³ , со скрытой формой зараженности - 25 г·ч/м ³ . Дегазация - не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)
		Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 8-10 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м ³ . Дегазация - не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
5 г/м ³	Сухие овощи в складах или под пленкой	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м ³ . Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
		Хлебные клещи	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 8-10 суток. ПКЭ -450 г·ч/м ³ . Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации пестицида
Фумифаст, ТАБ, Г (560 г/кг алюминия фосфида) от 6 марта 2017 г. № 1396

1	2	3	4	5
5 г/м ³	Зерноперерабатывающие и пищевые предприятия	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2-3 суток. ПКЭ для муки 7 г·ч/м ³ , для крупы только с явной формой зараженности - 7 г·ч/м ³ , со скрытой формой зараженности - 25 г·ч/м ³ . Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)

Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения ручных и механизированных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата:

в личных подсобных хозяйствах;

авиационным методом;

в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев





МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 388 от « 1 » апреля 2022 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ
АГРОХИМИКАТА

№ 1396 от « 6 » марта 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано ООО «Агро Эксперт Групп»,

ОГРН 1027708006996

(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Фумифаст, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 178-01-1396-1/388 на срок по
« 5 » марта 2027 г. и допускается к обороту на территории
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№000463

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, г/м ³	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0	Яблоки, слива, хурма, гранат	Восточная плодоножка, американская белая бабочка, многоядная муха-горбатка, западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 48 часов ПКЭ – 4 г*ч/м ³ . Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(-)
0,8	Персик, нектарин, абрикос, груша, айва, вишня			
1,0	Апельсины, грейфруты, мандарины, минеола	Средиземно-морская муха	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 72 часов ПКЭ – 5 г*ч/м ³ . Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
1,0	Томат, перец сладкий, картофель	Картофельная моль	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 48 часов ПКЭ – 4 г*ч/м ³ . Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
0,6	Капуста	Западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 4 г*ч/м ³ . Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
0,8	Смородина			



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Фумифаст, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) от 1 апреля 2022 г. № 388

1	2	3	4	5
0,4	Голубика, клубника, малина, ежевика, крыжовник, черника, виноград	Западный цветочный трипс	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 3 г*ч/м ³ . Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	-(1)
0,4	Срезанные цветы	Западный цветочный трипс, табачная белокрылка	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция – 2 суток. ПКЭ – 3 г*ч/м ³ . Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	
2,5	Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России	Насекомые – вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10 ⁰ С зерна – выше 15 ⁰ С Погружение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция – 3 суток. Дегазация зерна после разгрузки – не менее 8 суток. ПКЭ – 7 г*ч/м ³ . Для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и 25 г*ч/м ³ для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Проветривание в рейсе или на рейде перед разгрузкой не менее часа. Реализация при остатке фосфина в зерне не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	

Директор Департамента растениеводства, механизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Фумифаст, ТАБ
(560 г/кг алюминия фосфида) от 1 апреля 2022 г. № 388

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ручных и механизированных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

