

Культура земледелия



technoexport-agro.ru

АРИЗОН, МД

75 г/л мезотриона + 30 г/л никосульфурона
+ 3,5 г/л флорасулама

Послевсходовый гербицид для контроля сорняков в посевах кукурузы

- комплексный контроль злаковых и двудольных однолетних и многолетних сорняков
- сдерживает вторую «волну» сорной растительности
- широкое окно применения – 3–6 листьев культуры
- отсутствие необходимости составления баковых смесей
- гарантирует улучшенное проникновение благодаря препаративной форме - МД



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Барнаул +7 (913) 239-64-85
г. Волгоград +7 (844) 252-01-81
г. Казань +7 (917) 916-08-86
г. Липецк +7 (474) 255-56-54
г. Оренбург +7 (353) 237-88-58

г. Ростов-на-Дону +7 (863) 303-63-45
г. Тимашевск +7 (861) 309-50-15
г. Саратов +7 (927) 134-79-86
г. Ставрополь +7 (968) 274-43-55
г. Челябинск +7 (902) 602-56-00

Согласно Свидетельству о государственной
регистрации пестицида № 046-03-4359-1 от 15.01.2024 г.

Культура	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Кукуруза	1,0-2,0	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорных растений). При необходимости пересева в год можно высевать только кукурузу. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)



technoexport-agro.ru



АРИЗОН, МД

75 г/л мезотриона + 30 г/л никосульфурона
+ 3,5 г/л флорасулама



01.

Препарат нельзя применять с удобрениями, содержащими цинк, кобальт, железо и бор

02.

Интервал до и после обработки ФОС-инсектицидами и карбаматами (диазинон, хлорпирифос, диметоат, малатион и метомил) **должен составлять 7 дней**

03.

Не рекомендуются баковые смеси с инсектицидами из групп органофосфатов и карбаматов (диазинон, хлорпирифос, диметоат, малатион и метомил)

04.

Не требует добавления ПАВов. Все необходимые компоненты уже есть в составе препарата

05.

Уменьшение расхода рабочей жидкости ниже 100 л/га — недопустимо. Рекомендуемый расход рабочей жидкости — 200-300 л/га (согласно свидетельству о государственной регистрации пестицида)

06.

Предварительное перемешивание препарата в канистре перед применением — обязательно

07.

Не рекомендуется применять гербицид после 6 листа культуры, так как с 7–10 листа культуры начинается закладка количества рядов зерен в початке