



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1644 от « 12 » декабря 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ПАРАДИГМА», ОГРН 1132311008004

(наименование Регистрации, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид БФТИМ КС-2, Ж (титр не менее 1×10^9 КОЕ/мл
Bacillus amyloliquefaciens КС-2)

430-02-1644-1

получил государственную регистрацию за №

на срок по « 11 » декабря 2027

г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



№ 001862

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применение препарата л/т; л/га	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,5-2	Пшеница озимая	Гельминтоспо- риозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса	Обработке семян за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости-10 л/т	-(1)
2			Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га	-(2)
1,5-2	Ячмень озимый	Гельминтоспо- риозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	Обработка семян за 1-2 суток до посева. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
2			Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости -250-300 л/га	-(2)
3-4	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков болезней, последующее – с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	-(2)
5-6	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	-(4)
5-6	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	-(4)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 1 день.

Запрещено применение препарата: в личных подсобных хозяйствах;
авиационным методом; в водоохранной зоне водных объектов.

