

Культура земледелия



technoexport-agro.ru

ГРАСС, КС

312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина

Гербицид почвенного и листового действия против широкого спектра сорняков

- синергизм двух действующих веществ обеспечивает высокую продолжительность действия
- контроль всего спектра сорняков, включая виды с поздними сроками прорастания
- эффективная работа в самых экстремальных условиях
- широкое технологическое «окно» и различные варианты применения
- отсутствие влияния на последующие культуры в севообороте



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Барнаул +7 (913) 239-64-85
г. Волгоград +7 (844) 252-01-81
г. Казань +7 (917) 916-08-86
г. Липецк +7 (474) 255-56-54
г. Оренбург +7 (353) 237-88-58

г. Ростов-на-Дону +7 (863) 303-63-45
г. Тимашевск +7 (861) 309-50-15
г. Саратов +7 (927) 134-79-86
г. Ставрополь +7 (968) 274-43-55
г. Челябинск +7 (902) 602-56-00

Согласно Свидетельству о государственной регистрации пестицида № 046-03-3087-1 от 02.04.2021 г.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Подсолнечник	3,0-4,0	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание почвы до появления всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
Кукуруза			Опрыскивание посевов до появления всходов культуры или после всходов культуры (до фазы 3-го листа). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	



technoexport-agro.ru



ГРАСС, КС

312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина



01.

Поверхность поля должна быть выровнена и иметь мелкокомковатую структуру без крупных комков почвы, растительных остатков и всходов сорных растений

02.

Максимальная эффективность почвенников достигается в условиях **выпадения осадков не менее 10-15 мм**

03.

Не рекомендуется применять на легких или слабодренированных и подтопляемых почвах

04.

На тяжелых почвах или почвах с высоким содержанием гумуса следует использовать **максимальные нормы расхода препарата**

05.

Опрыскивание должно быть максимально равномерным, без «слепых зон». Расход рабочего раствора 200-300 л/га

06.

Скорость ветра умеренная, не более 4-5 м/с, не допускать снос рабочего раствора гербицида на соседние культуры

07.

Не использовать для приготовления рабочего раствора воду с температурой ниже +10°C. Температура воздуха должна быть в диапазоне от +10 до +25°C