



Царумин, ВК





Схема защиты зерновые

Семена	Протравливание	Твердая головня, фузариозная корневая гниль,гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, снежная плесень	Анкер Трио, КС 0,4-0,5 л/т							
		Внутрестеблевые мухи, хлебные блошки; хлебная жужелица	Имидасид, КС 0,3-0,6 л/т							
		Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, пыльная головня	Кайтокс, КС 0,5 л/т							
		Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	Инфикс КС 1,5- 2,0 л/т							
		Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	Футокс, КС 1,5- 1,75 л/т							
		Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, снежная плесень	Фенозол, КС 1,2-1,5 л/т							
Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Рузмин, ВР 2,0-8,0 л/га							
		Однолетние злаковые сорняки (вид щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)		Силимакс, МКЭ 0,4-0,5 л/га						
				Бенрил, ВДГ 10-25 г/га						
		Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения		Флортек, СЭ 0,3-0,5 л/га						
				Царумин, ВК 1,0-1,5 л/га						



Схема защиты зерновые

Вредители **Инсектицидная обработка**

Клоп вредная черепашка, блошки, злаковые тли, цикадки, трипсы, пьявица, хлебная жужелица, мухи злаковые внутрестеблевые, хлебные блошки, хлебные жуки

Болезни **Фунгицидная обработка**

Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз; ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев, пиренофороз

Гельминтоспориозные и фузариозные прикорневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков

Альфатек, КЭ 0,1-0,15 л/га

Диметек, КЭ 1,0-1,5 л/га

Сайдор, ВРК 0,15-0,2 л/га

Раймир, КЭ 0,75-1,0 л/га

Фактория, МКС 0,1-0,2 л/га

Карзитек, КС 0,3-0,6 л/га

Тузол, КЭ 0,4-0,5 л/га

Асинуин, СК 0,5-0,7 л/га



До посева



3 листа



Кущение



Трубкавание



Флаговый лист



Колошение



Цветение



Налив зерна



Схема защиты горох

Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Юзмар, ВР 0,75-1 л/га		
			Геразол, ВРК 0,5-0,75 л/га		
			Бентилон, ВР 2,0-3,0 л/га		
			Царумин, ВК 0,5-0,8 л/га		
Вредители	Инсектицидная обработка	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Альфатек, КЭ 0,1 л/га		
			Фактория, МКС 0,2-0,3 л/га		
Болезни	Фунгицидная обработка	Аскохитоз, ржавчина	Пирафикс, КЭ 0,4 л/га		





Схема защиты картофеля

Клубни	Протравливание	Колорадский жук, проволочники и ложнопроволочники	Кайтокс, КС 0,2-0,22 л/т	
Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Рузмин, ВР 2,0-8,0 л/га	
		Однолетние двудольные сорные растения.		Царумин, ВК 1,2 л/га
		Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные.		Дандрис, ВДГ 0,05 л/га
		Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое); многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)		Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га
Вредители	Инсектицидная обработка	Колорадский жук		Клерк, КЭ 0,2-1, л/га
				Сайдор, ВРК 0,1 л/га



До посадки



Всходы



Стеблевание



Бутионизация



Цветение



Начало
образования
клубней



Созревание



Схема защиты **лен**

Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Рузмин, ВР 3,0 л/га			
		Однолетние двудольные сорные растения		Царумин, ВК 0,8-1,0 л/га		
				Бентилон, ВР 3,0-4,0 л/га		
				Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га		



До посева



Всходы



Фаза
«Елочки»



Бутонизация



Цветение



Созревание



Царумин, ВК

состав препарата

МЦПА-кислоты 500 г/л

Селективный гербицид системного действия, для борьбы с двудольными сорняками в посевах зерновых колосовых, картофеля, гороха, льна и других культур.





Царумин, ВК

основные преимущества

- 1 Эффективен против широкого спектра двудольных сорняков включая выюнок полевой.
- 2 Высокая скорость начального действия.
- 3 МЦПА-кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей.
- 4 Не оказывает отрицательного влияния на культуру.
- 5 Имеет отличную совместимость с другими гербицидами.





Царумин, ВК

спектр действия более 100 видов сорных растений

Однолетние двудольные:

- аистник цикутовый
- василек синий
- амброзия полыннолистная
- горец (виды)
- горошек посевной
- горчица полевая
- яснотка пурпурная
- гречишка вьюнковая
- гречиха татарская
- гулявник (виды)
- дескурайния Софии
- желтушник левкойный
- звездчатка средняя
- марь белая
- пастушья сумка
- пикульник (виды)
- редька дикая
- лебеда раскидистая
- ярутка полевая
- щирица запрокинутая

Многолетние двудольные:

- бодяк (виды)
- одуванчик лекарственный
- осот полевой
- вьюнок полевой



Царумин, ВК

спектр действия: однолетние двудольные



Пастушья сумка



Канатник
терфраста



Яснотка
Пурпурная




Амброзия
полюнолистная



Горец вьюнковый



Пастушья сумка



Портулак



Горчица полевая



Паслен черный



Царумин, ВК

спектр действия: многолетние двудольные



Вьюнок полевой



Осоты



Царумин, ВК

механизм действия

Соли МЦПА проникают в растения через надземные органы в проводящую систему растений, хорошо передвигаются по флоэме и ксилеме в виде ионов. Смесь соединений подавляет образование ферментов и ростовых веществ, угнетая процессы дыхания и фотосинтеза.



Царумин, ВК

особенности применения



Зерновые : В фазу кущения до выхода в трубку

Рекомендуемое время обработки: При температуре от 15°C до 25°C тепла. Утренние и вечерние часы

Срок ожидания 57 суток



Царумин, ВК

особенности применения



Горох : в фазу 3-5
настоящих листьев при
высоте растения 10-15см
(избегая фазы цветения)

Рекомендуемое время обработки:
При температуре от 15°C до 25°C С
тепла. Утренние и вечерние часы

Срок ожидания 50 суток



Царумин, ВК

особенности применения



Картофель: До
всходов
культуры или
при высоте
ботвы 10–15 см


Рекомендуемое время обработки: При
температуре от 15 С до 25 С тепла.
Утренние и вечерние часы

Срок ожидания 50
суток



Царумин, ВК

особенности применения



Лен : В фазу
Елочки при
высоте
культуры 3-10
см

Рекомендуемое время обработки: При
температуре от 15 С до 25 С тепла.
Утренние и вечерние часы

Срок ожидания 50
суток



Царумин, ВК

особенности применения



Фаза развития однолетних двудольных сорняков:
2-4 настоящих листа (молодые, активно растущие сорняки)



Фаза развития многолетних двудольных сорняков:
розетка (молодые, активно растущие сорняки)

При выборе срока внесения предпочтительнее ориентироваться на стадию развития сорняков, и на стадию развития культуры!



Царумин, ВК баковые смеси (зерновые)

Царумин, ВР 0,7-1,5 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – базовая комбинация для борьбы с общей засоренностью полей

Царумин, ВР 0,5-1,5 л/га + Бенрил, ВДГ 0,01-0,025 кг/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – для борьбы с вьюнком и хвощом на зерновых.



Царумин, ВК баковые смеси (горох на зерно)

Царумин, ВР 0,5-0,8 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – базовая комбинация для борьбы с общей засоренностью полей

Царумин ВР 0,5-0,8 л/га + Бентилон, ВР 2-3 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – для контроля широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорняков.



Царумин, ВК

баковые смеси (картофель)

Царумин, ВР 0,6-0,8 л/га – базовая комбинация для борьбы с общей засоренностью полей

Царумин, ВР 0,6 л/га + Клерк, КЭ 0,2-1 л/га – для лучшего контроля однолетних многолетних двудольных и однолетних злаковых сорных растений

Царумин, ВР 0,6 л/га + Дандрис, ВДГ 0,05 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – для контроля однолетних и многолетних злаковых, а также двудольных сорных растений

Царумин, ВР 0,6 л/га + Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га – для контроля однолетних и некоторых многолетних двудольных и злаковых сорных растений.



Царумин, ВК

баковые смеси (лен)

Царумин, ВР 0,8-1 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – базовая комбинация для борьбы с общей засоренностью полей

Царумин, ВР 0,8-1 л/га + Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – однолетние и многолетние двудольные и однолетние злаковые

Царумин, ВР 0,8-1 л/га + Бентилон, ВР 1-3 л/га + Сильвер Голд 0,1 л/га – для контроля однолетних и многолетних двудольных



Царумин, ВК

приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор готовится непосредственно перед применением, для этого:

- Предварительно препарат перемешивают в заводской таре.
- Бак опрыскивателя на $\frac{1}{2}$ заполняют чистой водой, включают механизм перемешивания.
- Добавляют рассчитанное и отмеренное количество препарата.
- Продолжают заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием до полного объема.
- Перемешивание продолжают во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси.

Рабочий раствор использовать в день обработки.



Царумин, ВК

регламент применения

культура	Вредный объект	Способ, время, особенность применения	норма расхода препарата, г /га
Пшеница, ячмень яровые и озимые, рожь озимая и овес	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку озимых. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	0,7-1,5
Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	0,5-0,8
Лен-долгунец	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе елочки при высоте культуры 3-10см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	0,8-1,0
Картофель(среднеспелые и позднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	1,2



Царумин, ВК

через 20 суток после обработки



0,8 л/га в фазу 10 см гороха





Царумин, ВК

свидетельство о регистрации

АГРОМИР


МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3840 от « 18 » ноября 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано
ООО «АГРОМИР», ОГРН 1187746148424

(наименование регистрирующего органа, ФГО или иного государственного органа)
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Царумин, ВК (500 г/л МЦПА кислоты (смесь
(наименование пестицида или агрохимиката)
диметиламинной, калиевой и натриевой соли)

получил государственную регистрацию за № 070-03-3840-1
на срок по « 17 » ноября 2032 г. и допускается к обороту на
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов


№ 004286

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., тираж 100 экз.

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0-1,5	Пшеница, ячмень, рожь озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	57(1)
0,7-1,5	Пшеница, ячмень яровые, овес		Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	57(1)
0,5-0,8	Горох на зерно		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	50(1)
1,2	Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)	Лен-долгунец	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
0,8-1,0	Лен-долгунец		Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.





Схема защиты зерновые

Семена	Протравливание	Твердая головня, фузариозная корневая гниль,гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, снежная плесень	Анкер Трио, КС 0,4-0,5 л/т							
		Внутрестеблевые мухи, хлебные блошки; хлебная жужелица	Имидасид, КС 0,3-0,6 л/т							
		Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, пыльная головня	Кайтокс, КС 0,5 л/т							
		Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	Инфикс КС 1,5- 2,0 л/т							
		Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники	Футокс, КС 1,5- 1,75 л/т							
		Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, снежная плесень	Фенозол, КС 1,2-1,5 л/т							
Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Рузмин, ВР 2,0-8,0 л/га							
		Однолетние злаковые сорняки (вид щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая)		Силимакс, МКЭ 0,4-0,5 л/га						
				Бенрил, ВДГ 10-25 г/га						
		Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения		Флортек, СЭ 0,3-0,5 л/га						
				Царумин, ВК 1,0-1,5 л/га						



Схема защиты зерновые

Вредители Инсектицидная обработка Клоп вредная черепашка, блошки, злаковые тли, цикадки, трипсы, пьявица, хлебная жужелица, мухи злаковые внутрестеблевые, хлебные блошки, хлебные жуки

Болезни Фунгицидная обработка Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз; ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев, пиренофороз

Гельминтоспориозные и фузариозные прикорневые и стеблевые гнили, гельминтоспориоз, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков

Альфатек, КЭ 0,1-0,15 л/га

Диметек, КЭ 1,0-1,5 л/га

Сайдор, ВРК 0,15-0,2 л/га

Раймир, КЭ 0,75-1,0 л/га

Фактория, МКС 0,1-0,2 л/га

Карзитек, КС 0,3-0,6 л/га

Тузол, КЭ 0,4-0,5 л/га

Асинуин, СК 0,5-0,7 л/га



До посева



3 листа



Кущение



Трубкавание



Флаговый лист



Колошение



Цветение



Налив зерна



Схема защиты горох

Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Юзмар, ВР 0,75-1 л/га		
			Геразол, ВРК 0,5-0,75 л/га		
			Бентилон, ВР 2,0-3,0 л/га		
			Царумин, ВК 0,5-0,8 л/га		
Вредители	Инсектицидная обработка	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Альфатек, КЭ 0,1 л/га		
			Фактория, МКС 0,2-0,3 л/га		
Болезни	Фунгицидная обработка	Аскохитоз, ржавчина	Пирафикс, КЭ 0,4 л/га		



До посева



Набухание
семян



Всходы



Стеблевание



Бутонизация



Цветение



Начало
образования
бобов



Созревание



Схема защиты картофеля

Клубни	Протравливание	Колорадский жук, проволочники и ложнопроволочники	Кайтокс, КС 0,2-0,22 л/т	
Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения.	Рузмин, ВР 2,0-8,0 л/га	
		Однолетние двудольные сорные растения.		Царумин, ВК 1,2 л/га
		Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные.		Дандрис, ВДГ 0,05 л/га
		Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое); многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)		Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га
				Клерк, КЭ 0,2-1, л/га
Вредители	Инсектицидная обработка	Колорадский жук		Сайдор, ВРК 0,1 л/га



До посадки



Всходы



Стеблевание



Бутионизация



Цветение



Начало образования клубней



Созревание



Схема защиты **лен**

Сорняки	Гербицидная обработка	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения	Рузмин, ВР 3,0 л/га			
		Однолетние двудольные сорные растения		Царумин, ВК 0,8-1,0 л/га		
				Бентилон, ВР 3,0-4,0 л/га		
		Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое); многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)		Квизурил, КЭ 0,7-1,5 л/га		



До посева



Всходы



Фаза «Елочки»



Бутонизация



Цветение



Созревание



agromir.online

Задать вопрос

