



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4524 от « 25 » апреля 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Груп», ОГРН 1027708006996

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Промэкс, КЭ (125 г/л индоксакарба + 50 г/л лямбда-цигалотрина)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 178-01-4524-1

на срок по « 24 » апреля 2034 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№005067

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,2–0,3	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га	21(2)
		Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	
0,2–0,3	Подсолнечник	Подгрызающие совки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га	
		Луговой мотылек, хлопковая совка, подсолнечниковая огневка, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	
0,2–0,3	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га	
		Капустная моль, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	
0,2–0,3	Соя	Акациевая (бобовая) огневка, луговой мотылек, хлопковая совка, тли, трипсы, соевая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	
0,2–0,3	Картофель	Колорадский жук, тли, цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	7(2)
0,2–0,3	Свёкла сахарная	Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, подгрызающие совки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100–200 л/га	14(2)
		Свекловичные минирующие мухи, луговой мотылек, свекловичная минирующая моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га	

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов и в личных подсобных хозяйствах.

Срок выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

