



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2620 от « 23 » марта 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Групп», ОГРН 1027708006996

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Голден Ринг, ВР (150 г/л диквата)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 178-03(04)-2620-1

на срок по « 22 » марта 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений **Р.В. Некрасов**



М. П.



№002980

Для сельскохозяйственного производства в качестве гербицида:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2,0	Картофель продовольственный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2-3 дня до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	40(1)

Для сельскохозяйственного производства в качестве десиканта:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,5-2,0 2,0 (А)	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание растений в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га, при авиационном опрыскивании – 100 л/га	10(1)
2,0	Горох (на зерно)		Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
2,0	Рапс яровой и озимый (семенники и товарные посевы)		Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	
2,0 2,0 (А)	Картофель (продовольственный и семенной)		Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га, при авиационном опрыскивании – 50-100 л/га	
2,0 2,0 (А)	Картофель продовольственный и семенной (сильно облиственные сорта)		Опрыскивание посадок в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га, при авиационном опрыскивании – 50-100 л/га	10(2)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Голден Ринг, ВР (150 г/л диквата) от 23 марта 2020 г. № 2620

1	2	3	4	5
1,5-2,0 1,5-2,0 (А)	Соя	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационном опрыскивании – 50-100 л/га	10(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ на картофеле – 7 дней.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированной уборки культур после десикации – 10 дней.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



