

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культуры

Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый

Контролируемые объекты

Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост)

Норма расхода препарата

0,6–1,2 л/га для всех культур

Норма расхода рабочей жидкости

200–300 л/га

Способ, время, особенности применения

Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы двух листьев, до конца кушения однолетних злаковых сорных растений (независимо от фазы развития культуры)

Сроки ожидания (количество обработок)

60 дней (1)

Регистрант	ООО «Сингента»
Упаковка	5 л
Действующее вещество	50 г/л пиноксадена + 12,5 г/л клоквинтосет-мексила (антидот)
Химический класс	Фенилпиразолины
Класс опасности	3-й (умеренно опасное соединение)
Препаративная форма	КЭ (концентрат эмульсии)
Срок хранения	3 года

СКОНЦЕНТРИРОВАН НА РЕЗУЛЬТАТЕ!



Усовершенствованный послевсходовый гербицид избирательного действия для контроля злаковых сорняков на пшенице и ячмене



syngenta.

Необходимо соблюдение правил по безопасному применению, транспортировке и хранению препарата, отраженных на тарной этикетке, размещенной на упаковке. Товар сертифицирован. Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаками ® и ™, рамка «Альянс» и символ «Росток» — зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Копирование и воспроизведение материала (полностью или частично) без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены.

© ООО «Сингента», 2022

Агроподдержка
Сингенты

Получите совет эксперта



syngenta.ru



УНИВЕРСАЛЕН

АКСИАЛ® — эффективный послевсходовый гербицид избирательного действия на основе пиноксадена.

АКСИАЛ® устанавливает новые стандарты защиты пшеницы и ячменя от злаковых сорняков, обеспечивая высокую эффективность против широкого спектра сорных растений, сохранность культуры и гибкость применения.

АКСИАЛ® совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на зерновых культурах в те же сроки.

Усовершенствованный АКСИАЛ® 50

- ◆ Содержание действующего вещества увеличено до 50 г/л.
- ◆ Гектарная норма расхода препарата:
 - снижена до 0,6–1,2 л/га,
 - одинакова для всех зарегистрированных культур.

Теперь контроль сорняков стал проще и эффективнее!




АКСИАЛ® можно вносить в широком диапазоне фаз развития культуры и сорняков (от двух листьев до конца кушения сорняка). Оптимальное время для обработки — 3–4 настоящих листа сорняка независимо от фазы развития культуры.

ЭФФЕКТИВЕН

- ◆ Исключительная эффективность против всего спектра однолетних злаковых сорняков.
- ◆ 100%-ный контроль овсяга в посевах зерновых.
- ◆ Высокая селективность к культуре.
- ◆ Возможность использования в баковой смеси с противодвудольными гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и росторегуляторами.
- ◆ Широкое окно применения.
- ◆ Лучший партнер для баковой смеси (**КАМАРО®**, **ЛИНТУР®**, **ДЕРБИ™ 175**).
- ◆ Отсутствие ограничений в севообороте.
- ◆ Уникальная дождеустойчивость (не смывается через 30–60 мин после обработки).
- ◆ Качественная препаративная форма.

Обрабатываемая площадь зерновых гербицидом АКСИАЛ®, га



АКСИАЛ® показывает высокую эффективность против комплекса злаковых сорняков.



Применение гербицида **АКСИАЛ®** в посевах пшеницы. Новосибирская область