



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3879 от « 22 » ноября 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Групп», ОГРН 1027708006996

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Момус, ВРК (500 г/л МЦПА кислоты (смесь диметиламинной,
(наименование пестицида или агрохимиката)
калиевой, натриевой солей)

получил государственную регистрацию за № 178-03-3879-0

на срок по « 21 » ноября 2025 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений **Р.В. Некрасов**



М. П.



№ 004329

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,0-1,5	Пшеница, рожь, ячмень озимые	Однолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	55(1)
0,7-1,5	Пшеница, ячмень, овес, яровые		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	55(1)
0,5-0,8	Горох на зерно		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	52(1)
1,2	Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)		Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	45(1)
0,8-1,0	Лен масличный		Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры до 10 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	59(1)
0,8-1,2	Клевер полевой и ползучий		Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1 тройчатого листа. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
0,8-1,2	Клевер полевой под покровом ячменя		Опрыскивание посевов в фазе 1-2 тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

