



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

## ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 294 от « 25 » марта 2020 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ  
АГРОХИМИКАТА

№ 1854 от « 5 » апреля 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано ООО «СИНГЕНТА»,  
ОГРН 1037739325271

(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»  
пестицид Амистар Голд, СК (125 г/л азоксистробина + 125 г/л  
дифеноконазола)  
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-02-1854-1/294 на срок по  
« 4 » апреля 2028 г. и допускается к обороту на территории  
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами  
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

№ 000357





Для сельскохозяйственного производства:

| Норма расхода препарата, л/га | Культура        | Вредный объект                     | Способ, время, особенности применения                                                                                                                                        | Срок ожидания (кратность обработок) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                  | 4                                                                                                                                                                            | 5                                   |
| 0,75-1,0                      | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении единичных признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 14-21 день. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 30(2)                               |

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

