



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1253 от « 21 » октября 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано

ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТИБСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Лонтрел гранд, ВДГ (750 г/кг клопиралида)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 009-03-1253-1

на срок по « 20 » октября 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекаркин


(подпись)



М. П.



№ 001422

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработки)
2	1	3	4	5
0,06-0,12	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе кушения – до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
0,12	Свекла сахарная	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(2)
0,04+0,08			Опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев культурных растений по сорным растениям первой и второй волны. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,12	Лен-долгунец	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки листьев многолетних корнеотпрысковых сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
0,12	Рапс яровой и озимый	Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)			-(1)
0,12-0,25	Газоны (территории спортивных сооружений)	Однолетние и многолетние двучольные сорные растения (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка, амброзия)	Опрыскивание газонов по вегетирующим сорным растениям после первого укоса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней после обработки	-(1)

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; авиационным методом; в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 1 день, для ручных – 7 дней.

