



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4736 от « 27 » ноября 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Альто Супер, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-02-4736-1

на срок по « 26 » ноября 2034 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№005300

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4-0,5 0,4-0,5 (А)	Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев, септориоз колоса, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га	40(1-2)
0,4-0,5	Пшеница озимая	Церкоспореллезная гниль корневой шейки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)
0,4-0,5 0,4-0,5 (А)	Ячмень яровой, озимый	Темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га	40(1-2)
0,4-0,5 0,4-0,5 (А)	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га	40(1-2)
0,4-0,5 0,4-0,5 (А)	Тритикале озимый	Пиренофороз, септориоз, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га	40(1-2)
0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	40(1-2)
0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз, альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе - через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1-2)

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, в водоохраной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода людей на обработанные площади по уходу за растениями для проведения механизированных работ – 3 дня.

